

Biermannia King '&' Pantling 1897

Việt Nam có 2 trong số 11 giống trên thế giới.

1 *Biermannia calcarata* Avery. 1988.

Đồng danh: *Arachnis siamensis* (Schltr.) Tang & F.T.Wang 1951.



Ảnh: Pierre Bonnet



Ảnh: RV Orchidwork.com

Tên Việt: Bạch manh móng (PHH), Biếc man bắc (TH).

Mô tả: Phong lan thân rất ngắn, lá 4-5 chiếc dài 3-5 phân. Hoa 5-6 chiếc nở vào mùa Đông.

Nơi mọc: Cát bà, Cát hải, Cúc Phương.

2 *Biermannia sigaldii* Seidenf.1992

Đồng danh: *Biermannia bimaculata* (King & Pantl.) King & Pantl. 1898.



Ảnh: Flickr .com

Tên Việt: Bạch manh (PHH), Biếc man trung (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, thân dài 4-5 phân, lá dài 5 phân. Chùm hoa dài 7-10 phân. Hoa 2-3 chiếc to 8 ly tới 1 phân, mới nở màu trắng rồi biến sang vàng, nở vào mùa Hạ.

Nơi mọc: Lâm Đồng, Đà Lạt, Nam Cát Tiên.

Ảnh: Lê trong Châu

