

## ***Bromheadia*** Lindley 1841 viết tắt Brom.

Trên thế giới có khoảng 20 giống, Việt Nam có 3.

### 1 ***Bromheadia anamensis*** Aver & Averyanova 2006



Ảnh: Nguyễn văn Cảnh



Ảnh: Nguyễn văn Cảnh



Ảnh: Nguyễn văn Cảnh



Ảnh: Võ văn Thành



Ảnh: Võ văn Thành

**Tên Việt:** Chưa có.

**Mô Tả:** Phong lan, lá hình ống có lòng máng, thân cây cao tới 60 cm, chùm hoa trên đỉnh ngọn, 1-2 hoa, nở vào khoảng tháng 4-5 (Theo Nguyễn văn Cảnh).

**Nơi mọc:** Núi Chúa, Ninh Hải, Ninh Thuận, Gialai? Kontum ?

2 *Bromheadia aporoides* Reichb.f. 1878



Ảnh: Alex & Karel Petrzelka



Ảnh: Nguyễn văn Cảnh



**Tên Việt:** Lan đầm lầy (TH).

**Mô tả:** Phong lan mọc thành bụi nhỏ cao 10 phân, lá dẹt, hoa 1-2 chiếc ở trên ngọn, to 2 phân nở vào mùa Hạ.

**Nơi mọc:** Tây Nguyên, Đầm Ron, Đà Lạt.

Ảnh: Orchidonline

### 3 *Bromheadia finlaysoniana* (Lindl.) Miq. 1859

**Đồng danh:** *Bromheadia finlaysoniana* var. *palustris* (Lindl.) J.J.Sm. 1911; *Bromheadia finlaysoniana* var. *sylvestris* [Ridl.] Holttum 1953.



Ảnh: Nguyễn vũ Khôi



Ảnh: Nguyễn vũ Khôi

**Tên Việt:** Lan đầm lầy (TH).

**Mô tả:** Địa lan, thân cao trên 2 thước, chùm hoa ở gần ngọn dài 15-20 phân, hoa to 8 phân nở liên tiếp vào mùa Xuân, Hạ, Thu, tới 30-40 hoa nhưng chỉ vài chiếc một lần vào buổi sáng rồi tàn.

**Nơi mọc:** Dak Lak, Đồng Nai, Sông Bé, Phú Quốc.