

## *Drymoda* Lindl.

Trên thế giới có 2 giống, Việt Nam có 2 và đây là loài lan mới tìm thấy lần đầu.

### 1 *Drymoda picta* Lindl. 1838



Ảnh: Nguyễn văn Cảnh



Ảnh: orchid.unibas.ch

#### Tên Việt:

**Mô Tả:** Phong lan rất nhỏ, củ hình tròn và đẹt màu nâu tím khác với màu nâu đỏ của cây *Drymoda siamensis*, đường kính khoảng 0.5-1 phân, 2 lá màu xanh hơi có ánh bạc lá to, bản khoảng 1phân, dài 2 phân. Hoa nhỏ hoa đơn độc, ngang 1.5-2 phân, cuống hoa dài 4 chừng phân, không thơm và tàn trong khoảng 10 ngày.

**Nơi Mọc:** Do Nguyễn văn Cảnh tìm thấy tại Dắc Song, Đắc Nông, Đắc Lak vào tháng 1-2014.

2 *Drymoda siamensis* Schltr. 1906

Ảnh: Cao bá Hào



Ảnh: Khương hữu Thắng



Drymoda picta và Dry.siamensis

Ảnh Nguyễn văn Cảnh

**Tên Việt:**

**Mô tả:** Cây cao chừng 3-4 phân, củ tròn, dẹt và nhẵn nheo, lá 2 chiếc, rụng vào mùa Thu. Cuống hoa dài 3-3.5 phân, hoa đơn độc to 1.5 phân nở vào mùa Đông- Xuân, không thơm và tàn trong khoảng 10 ngày.

**Nơi mọc:** Do Cao bá Hào tìm thấy ở Krong Ana, Đắc Lắc và Khương hữu Thắng tìm thấy ở Bù Gia Mập, Bình Phước.

*Drymoda gymnopus* (Hook.f.) Garay, Hamer & Siegerist 1994 - Xin xem *Bulbophyllum gymnopus* Hook.f. 1890.

*Drymoda latisejala* Seidenf. 1981 - xin xem *Bulbophyllum capillipes* C.S.P.Parish & Rchb.f. 1874.