

Hemipilia Lindl. 1835

Trên thế giới có 17 giống, Việt nam có 2.

1 *Hemipilia calophylla* E.C.Parish & Rehb.f. 1874

Đồng danh: *Galearis subrotunda* (King & Pantl.) P.F.Hunt 1971; *Hemipilia amethystina* Rolfe ex Hook.f. 1897; *Orchis subrotunda* King & Pantl. 1897.



Ảnh: qsbg.org



Ảnh: qsbg.org

Tên Việt:

Mô tả: Địa lan hay thạch lan nhỏ, lá 1-2 chiếc dài 7, rộng 4-5 phân, có sọc màu nâu. Chùm hoa cao 5-10 phân, hoa 1-4 chiếc to 1.5-2 phân, nở vào mùa Thu.

Nơi mọc: Nguyễn tiến Hiệp, Leonid Averyanov và Phan kế Lộc đã tìm thấy tại Lai Châu năm 2006 và tại Quan Sơn, Thanh Hoá vào tháng 8 năm 2007.

Ảnh: Leonid Averyanov



2 *Hemipilia discolor* Aver. & Averyanova 2006



Ảnh: Leonid Averyanov



Ảnh: Leonid Averyanov

Tên Việt:

Mô tả: Thạch lan lá 2 chiếc dài 12 phân. Chùm hoa cao 6-12 phân, hoa 4-12 chiếc to 8-10 phân.

Nơi mọc: Các giáo sư: Nguyễn tiến Hiệp, Leonid Averyanov và Phan kế Lộc đã tìm thấy ở Bản Thi, Chợ Đồn, Bắc Cạn vào tháng 5 năm 2004.