

## *Monomeria* Lindl. 1830

Trên thế giới có 5 giống, Việt Nam có 3.

### 1 *Monomeria barbata* Lindl. 1830.

**Đồng danh:** *Epicranthes barbata* (Lindl.) Rchb.f. 1861; *Monomeria crabro* C.S.P.Parish & Rchb.f. 1874.



Ảnh Đinh văn Tuyền



**Mô tả:** Thạch lan hay phong lan nhỏ, củ mọc xa nhau 7-9 phân. Chùm hoa cao 30-45 phân, hoa 10-15 chiếc, to 2-5 phân, nở vào mùa Xuân.

**Nơi mọc:** Hoàng Liên Sơn, Lào Cay, Tây Nguyên?

### 2 *Monomeria dichroma* (Rolfe) Schltr. 1914

**Đồng danh:** *Bulbophyllum jacquetii* Gagnep. 1930; *Ione dichroma* (Rolfe) Gagnep. in H.Lecomte 1933; *Sunipia dichroma* (Rolfe) Nguyen Tien Ban & Duong DucHuyen 1984.



Ảnh: Bùi xuân Đáng



**Tên Việt:** Đơn hành lưỡng sắc (PHH), Củ đơn Việt (TH).

**Mô tả:** Phong lan, củ mọc xa nhau, chùm hoa dài 30-35 phân, hoa 10-15 chiếc, to 4-5 phân, nở vào mùa Xuân.


**Nơi mọc:** Tây nguyên, Lâm Đồng.

### 3 *Monomeria gymnopus* (Hook.f.) Aver., 1994

**Đồng danh:** *Bulbophyllum gymnopus* Hook.f., 1890. *Drymoda gymnopus* (Hook.f.) Garay, Hamer & Siegerist 1994.



Ảnh: Leonid Averyanov



Ảnh: Leonid Averyanov

**Mô tả:** Phong lan hay thạch lan thân bò dài trên cây hoặc trên đá. Lá một chiếc, chùm hoa cao 12-15 phân, hoa to 1 phân, mùi hôi khó ngửi, nở vào mùa Đông.

**Nơi mọc:** Leonid Averyanov, Phan Kế Lộc và Phạm Văn Thế tìm thấy ở Na U, Điện Biên vào ngày 9-12-2010.