

Papilionanthe Schlechter 1915

Trên thế giới có 11 giống, Việt Nam có 3.

1 *Papilionanthe hookeriana* (Rchb. f.)Schlechter 1915

Đồng danh: *Vanda hookeri* Hort. 1882, *Vanda hookeriana* Rchb.f 1856.



Ảnh: forum.theorchidsource.com

Ảnh: www.orchidsonline.com.au

Tên Việt: Vân lan (PHH), Bướm môi nguyên (TH).

Mô tả: Phong lan hay địa lan, thân nhỏ, cao trên 1 m, lá hình ống như chiếc đĩa dài 10-15 cm. Hoa mọc ở gần ngọn từ 3-12 chiếc, to 4-7 cm. Môi hoa có những chấm tím, nở 2-3 chiếc một, vào xuân và hạ. Hoa lâu tàn.

Nơi mọc: Đà Lạt, Biên Hòa, Đồng Nai.

2 *Papilionanthe pedunculata* (Kerr) Garay 1974

Đồng danh: *Aerides pedunculata* Kerr 1935; *Vanda masperoae* Guillamin. 1951.



Ảnh: Bùi Xuân Đáng



Ảnh: Bùi Xuân Đáng

Tên Việt: Long Châu (PHH), Lan bướm Long Châu (TH).

Mô tả: Phong lan thân, lá hình ống cao tới 2 th. Chùm hoa dài 50 phân, hoa 7-15 chiếc. to 5 phân, nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Tây Nguyên, Lâm Đồng.

3 *Papilionanthe* (Roxb.) Schltr. 1915

Đồng danh: *Papilionanthe teres* f. *candida* (Rchb.f.) Christenson 1994; *Vanda teres* (Roxb.) Lindl. 1833; *Vanda teres* var. *candida* Rchb.f 1875

Tên Việt: Lan cảnh giao, Vân lan (PHH), Lan bướm hồ điệp (TH).

Mô tả: Phong lan thân dài trên 1 thước. Thân và lá hình ống. Chùm hoa ngắn 20-30 phân. Hoa 3-6 chiếc, to 7-10 phân, thơm, nở vào Xuân-Hạ.

Nơi mọc: Thừa Thiên, Lâm Đồng.



Ảnh: Bùi xuân Đáng