


***Pecteilis*** Raf. 1836

Trên thế giới có 8 giống, Việt Nam có 4 giống.

**1** *Pecteilis cambodiana* (Gagnep.) Aver. (1988).

**Đồng danh:** *Parhabenaria cambodiana* (Gagnep.) Aver.



Hình vẽ: Leonid Averyanov



Ảnh: Phùng mỹ Trung

**Tên Việt:** Trâm lan, Cam bột (PHH).

**Mô tả:** Địa lan cao 30 phân. Lá 5-6 chiếc. Chùm hoa ở ngọn, hoa 2-3 chiếc, to 4 phân, nở vào mùa Hạ.

**Nơi mọc:** Đắc Lắc, Đồng Nai.



Ảnh: Phùng mỹ Trung

## 2 *Pecteilis cochinchinensis* (Gagnep.) Aver. 1988

**Đồng danh:** *Parhabenaria cochinchinensis* Gagnep.1951.

**Chưa tìm thấy hình ảnh**

**Tên Việt:** Bạch Phượng (PHH, TH).

**Mô tả:** Địa lan đặc hữu của Việt Nam, cao phân lá 4-6 chiếc, dài 20-30 phân, rộng 2-3 phân. Chùm hoa mọc ở ngọn hoa 2-3 chiếc.

**Nơi mọc:** Đồng Nai, Tân Biên, Tây Ninh.

*Pecteilis henryi* Schlechter, 1919. Xin xem *Pecteilis susannae* (Linnaeus) Rafinesque

## 3 *Pecteilis sagarikii* Seidenfaden 1973

**Đồng danh:** *Habenaria sagarikii*.



Ảnh: Phạm đình Hiệp



Ảnh: Nguyễn văn Cảnh

**Tên Việt:** Lan mỏ vịt.

**Mô tả:** Địa lan, thân và lá chết vào mùa đông nhưng mùa Xuân sẽ mọc cây mới từ củ. Lan có 2-3 lá ở sát gốc, chùm hoa cao 15-20 phân, hoa ở ngọn từ 2-10 chiếc, to 1.5-2 phân, nở vào tháng 8-9, hơi thơm.

**Nơi mọc:** Easup, Đắc Lắc (tin tức do Phạm đình Hiệp và Nguyễn văn Cảnh cung cấp).

**4** *Pecteilis susannae* (L.) Raf. 1837

**Đồng danh:** *Habenaria susannae* (L.) R.Br. 1810; *Hemihabenaria susannae* (L.) Finet 1902.

**Tên Việt:** Bạch phượng (PHH), Bạch phượng tua (TH).

**Mô tả:** Địa lan cao 50-70 phân. Lá 4-6 chiếc. Chùm hoa ở ngọn, cao 5-7 phân, hoa 4-7 chiếc to 4-10 phân, nở vào mùa Hạ.

**Nơi mọc:** Tam đảo, Lâm Đồng, Đồng Nai.



Ảnh: Alex & Karel Petrzelka