

Tuberolabium Yamamoto 1924

Trên thế giới có chừng 15 giống, Việt Nam có 2.

1 *Tuberolabium elobe* (Seidenf.) Seidenf. 1988

Đồng danh: *Parapteroceras elobe* (Seidenf.) Aver. 1990; *Pteroceras elobe* Seidenf. 1969.



Ảnh: Ron Mac Hatton

Tên Việt:

Mô tả: Phong lan nhỏ thân, dài 5-12 phân. Lá dài 17 phân, rộng 2 phân. Chùm hoa dài 10-20 phân, hoa 8-12 chiếc, to 1 phân, nở vào mùa Hạ.

Nơi mọc: Đà Lạt, Lâm Đồng.

2 *Tuberolabium rhopalorrhachis* (Rchb. f.) J.J. Wood 1990

Đồng danh: *Thrixspermum rhopalorrhachis* [Rchb.f] Rchb.f. 1867; *Trachoma rhopalorrhachis* (Rchb. f.) Garay 1972



Ảnh: Lê Trọng Châu



Ảnh: Lê Trọng Châu

Tên Việt:

Mô tả: Phong lan nhỏ, lá 3-6 chiếc. Chùm hoa ngắn, hoa 5-7 chiếc, to 1 phân, thơm nhưng mau tàn, nở vào cuối Đông, đầu Xuân.

Nơi mọc: Đà Lạt, Lâm Đồng.