

Uncifera Lindl. 1858

Trên thế giới có 6 giống, Việt Nam có 2.

1. *Uncifera dalatensis* (Guillaumin) Seidenf. & Smitinand 1965.

Đồng danh: *Saccolabium dalatense*.



Ảnh: vuonlan.vn



Ảnh: Nông Văn Duy

Tên Việt: Móng Đà Lạt (PHH), Hàm cọp Đà Lạt (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, thân cao 10-15 phân, là 5-6 chiếc, dài 20-25 phân. Chùm hoa rũ xuống dài khoảng 20 phân, hoa 15-20 chiếc, nở vào mùa Thu.

Nơi mọc: Đà Lạt, Lâm Đồng.

2. *Uncifera lancifolia* (King & Pantl.) Schltr. 1914

Đồng danh: *Saccolabium lancifolium* King & Pantl. 1896.



Ảnh: Leonid Averyanov



Ảnh: flickr.com

Mô tả: Phong lan nhỏ, thân buông thõng chùm hoa dài 5-10 phân, hoa mọc dầy 15-30 chiếc, nở vào mùa Xuân-Hạ.

Nơi mọc: Hoàng Liên Sơn, Lào Cai.

3. *Uncifera obtusifolia* Lindl.

Đồng danh: *Gastrochilus obtusifolius* (Lindl.) Kuntze 1891; *Gastrochilus obtusifolius* (Lindl.) A.S.Rao & S.F.Mukerjee 1973; *Saccolabium obtusifolium* (Lindl.) Hook.f. 1890; *Uncifera heteroglossa* Rchb.f. 1878.



Ảnh: Lê Trọng Châu



Ảnh: Vũ Định An



Ảnh: Nghiêm Xuân Sơn



Ảnh: Lê Hoàng Hải

Tên Việt: Chưa có.

Mô tả: Phong lan, thân đơn, cao 20-30 phân, lá dài 10-120 phân, ngang 2-3 phân, chùm hoa buông thõng dài 10-15 phân, hoa 15-25 chiếc, to 2-3 phân, màu vàng nở vào mùa Thu.

Nơi mọc: Lê Hoàng Hải, Lê Trọng Châu, Vũ Định An, Nghiêm Xuân Sơn tìm thấy ở Lâm Đồng năm 2015.