

Barkeria (Knowles & Westcott 1838)

Barkeria viết tắt (Bark.) là một loài phong lan gồm khoảng từ 16-18 giống mọc ở các nước Trung Mỹ, được tìm thấy vào khoảng năm 1800. Tên đặt ra để vinh danh một nhà trồng lan người Anh: George Barker.

Vóc dáng nhỏ, cành lá thanh lịch, hoa nhiều, màu sắc đẹp đẽ nên được nhiều người ưa chuộng.

Sau đây là hình ảnh của loài lan này:

Barkeria archilarum




Orchid Species

Barkeria barkeriola



Wikimedia Commons

Barkeria delpinalii




Orchid Species

Barkeria dorotheae



Weyman Bussey

Barkeria fritz-halbingeriana



Orchid Species

Barkeria lindleyana




Orchid Species



Barkeria melanocaulon
Nelocactus.org

Barkeria naevosa
Orchids.wikia.com





Barkeria obovata
Orchid Species

Barkeria obovata
Diederick 2005



Barkeria palmeri
Orchid Species

Barkeria palmeri

photo by Jay Pfahl



Barkeria scandens
Orchids.wikia.com

Barkeria skinneri



Orchids.wikia.com

Barkeria schoemakeri



Orchid Species


Barkeria spectabilis

Orchids.wikia.com



Barkeria strophinx

Orchids.wikia.com





Barkeria vanneriana
Andy's Orchids



Barkeria uniflora
American Orchids Society



Barkeria whartonia
Roellke Orchideen

Loài lan này ưa trồng trên mảnh gỗ, không thích trồng trong chậu vì rễ to và dài thường mọc ra bên ngoài. Nếu trồng trong chậu, cây lan khó sống qua năm thứ hai. Lan rụng lá vào mùa Đông, nên cần ngưng tưới nước, bón phân và chỉ tưới lại khi có mầm non mọc ra. Khi này nên tưới nhiều và tưới cho đẫm, vào mùa Hè nóng nực nên tưới 2-3 lần một ngày. Bón với phân 15-15-15, pha loãng 1/4 thìa cà phê gạt cho 1 gallon nước. (Xin xem trong "[Trồng Lan Barkeria](#)").



HLVN