

Thay Chậu Rhynchostylis Khi Đang Có Hoa

BÙI XUÂN ĐĂNG

Cây Ngọc điểm Vỹ Hồ (*Rhynchostylis retusa*) đang có hoa nhưng bị nấm bệnh. Lá cây có vài đốm đen, có chỗ bị quầng vàng úa chứng tỏ đã bị nhiễm trùng. Thêm vào đó là có rệp sáp cho nên tôi quyết định thay chậu mặc dầu chùm hoa khá đẹp, khá thơm và mới nở được trên 2 tuần lễ.



Ngâm chậu vào nước khoảng nửa giờ để cho dễ dàng gỡ rễ ra khỏi chậu. Dù rằng trồng trong chậu đất với một chút than và vỏ thông lớn, nhưng có lẽ đã quá 3 năm không thay nên đã bị mục nát. Tất cả các rễ quấn quanh theo thành chậu tuy không bò ra ngoài, nhưng một vài khúc đã thối rữa.



Dùng kéo đã đốt nóng, cắt bỏ các rễ thối, bóc hết các cuống lá bị khô để cho lũ rệp sáp núp trong những mật khu đó, lâu lâu lại bò ra tập kích, không còn chỗ ẩn nấp.

Phun thuốc Physan 20 với dung lượng 2 thìa cà phê cho 4 lít nước và thuốc trừ rệp sáp có dầu như sau:

- Dùng cồn 70% (*isopropyl* hay *rubbing alcohol*). Không nên dùng cồn *ethanol* hay *methanol* vì 2 thứ này ngâm sâu vào trong lá.
- Với chiếc bình, xịt 1.50 lít nước, 50/50 cồn và nước ấm.
- 1 thìa cà phê dầu thực vật như dầu bắp, đậu nành v.v...
- ½ thìa cà phê xà phòng rửa bát.
- Lắc cho đều mỗi khi phun thuốc.



Dùng bàn chải đánh răng loại mềm, chà sát để chắc chắn rằng trứng của rệp sẽ bị loại trừ đến tận hang ổ. Chỗ lá bị nhiễm trùng được cắt lui vào phía trong khoảng 2-3 phân và phun thuốc Physan 20 vào chỗ vết cắt.



Sau đó bỏ cây vào chậu và chèn bằng xơ dừa (*coconut fiber*) cho chặt và xin đùng nhâm lẫn với vỏ dừa (*coconut chip*). Phun thêm một lần Physan 20 nữa vào toàn cây và chỗ lá bị cắt.

Cây *Rhynchostylylis retusa* sau khi được thay chậu, hoa vẫn còn tươi tốt tới 2 tuần lễ sau mới tàn.



Placentia, mùa Hè 2008